Palava

Vass7R12s326-330

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp845

\* Range 330

Falava. 7 R 123-326,330







tautushan <mark>akan matau aharan karan k</mark>

NOM Palava (m)

+-

EMPLACEMENT. 7 R12 x 326.330

ouche	Whre	Débourrement				Floraison			Véraison			
O di O i i c	yeux	debut	mi/déb	grap	lité	debut	mi/f	fin	début	mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5	4 5	6,3	13.3.		Grappe Pour : Baie : Couleu Saveur Pépins Port :	TC - Cdisc-spr c : B-C : s d	Mil 5 - 4 5 - 4 6 - 85- m - a 6 - ap	1 : - P ! -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: bov-cy:	l-fus : inc ·		: L - ::- C

ASSEST: 1996 HOM Palaua EMPLACEMENT . 7 RAZ & 326.330 Bd 3 P.89 | Tloraison | debut | mi/f | fin Débourrament l'hie Ferti-Whre Véraison iche. début mi/déb grap 1165 debut mi/v fin maturité yeux ٠. 1 8 3 Grappo: G - M - P Dim: Compacité : L - 11- C rour: Mill: 4 Baio: To - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré 1) ( 11.3 36 (-5) Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort: Vigueur :

VHOPE: 1338 HMPLACEHETT 7 R12 326\_330 Palasa HOAT mi Véraison début mi/v fin Maturit€ Débourrement Uhre début mi/oéb grap Ferti-Floraison libre iche lité debut mi/E fin yeux 9-3 6 16.3 5 225 25.5 H 21 Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - 14 -C 2 6-3 Pour : MILL: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus 9 Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pópins : avec - apyrène Port : Vigneur : "

Luutuolimina Luutuolimina N° d'ordre :

Juntanilanta

7 R 12 s-326. 330 s. 3 Palava

ilantanlarinalantaalantiil

Désignation : Emplacement :

## (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189/cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/18 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 / jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etales - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 / cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280) - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205/- fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 > autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 2(17) duveteux 2(18) - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282/ sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 204 /- cotonneux 225 - sans villosité pubescente 204 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

#### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 283)

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 2/37)duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 93

N° d'ordre :

Juutanlandi

Désignation :

Emplacement :

Falava 7 R 122-326.330 A.3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtele. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 283.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256 Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

# (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Palvo 93

N° d'ordre Désignation :

liminilimi

Palava 7 R 12 s. 326.330 A.3

dantantaniaalaataalaat

Emplacement :

# FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/2) - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274) - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen 1(71) - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 18 sillon - partiellement - totalement. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calin 93

# Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année 1918
Code cepage: Polovo
Nom cépage: Polovo

+ 1 Innimi

Observateur: lacombe

Code clone

Emplacement 7 R12 5 3 26. 330

# Grappe

oiv 202 longueur : très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.

oiv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.

oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 7 - moitié 5 - plus de la moitié 7.

oiv 208\* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2

oiv 209\* présence d'un aileron : absent 7 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.

#### Baie

oly 220 longueur: tres courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 3 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. ojy 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm)(3)- moyenne (14-20mm)(5 - large (20-20mm) 7 - très large (≥26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme(3) ojy 223 forme aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3)- ovoide 4 - troncovoide 5 - obovoide 6 -. ylindrique 7 - arquée 8. biy 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2 onv 227 pruine nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. ouv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5)- épaisse 7 - tres épaisse 9. oiv 229 **ombili**c peu apparent(1) - apparent 2. oiy 230\* coloration de la pulpe : non coloree 1)- coloree 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée (1)- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe: peu juteuse 1 - juteuse 2 oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<05) 3 - moyen (05-75) 5 élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3)- moyenne 5 - élevée 7 - très élevce 9. oiv 236 saveur aucune 1) - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbace 4 - goût spécial 5. oiy 236\* saveur: aucune (1)- goût muscat 2 - goût foxe 3 - autre 4 oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) (3)- moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. ouv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5) - difficile 7 - très difficile 9. ouv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3) oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9 7 - AMM oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pepins secs) très faible (~10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (~65mg) 9 oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins absentes(1)- presentes Vassal grappe axe de la rafle : non colore 81)- colore 80.

## Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année

2000

Observateur

Code cepage Nom cepage Palava

+2 Luntradento

Code clone

Emplacement: 7 R12x326-33

#### Sarment

oiv 101 section transversale circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 🕅

oiv 103 couleur générale : jaune (1) - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles absentes D- présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 0 - présence 0

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence présence

oiv 353 longueur entrenocuds : très courts (-60mm) 1 - courts (90mm) @ -moyens (120mm) 5

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (5mm) | petit (8mm) B moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (17mm) 9

(14mm) 7 - très grand (~17mm) 9

Via 35

#### Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : tres faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - tres élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 - moyen 5 - clevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 éleve très élevé 9

Vassal

Noends aplatis I movens O- saillants 3